

Dotation médicale pour un éloignement jusqu'à 200 miles d'un abri

Localisation dans le contenant Effet thérapeutique	Dénomination Commune Internationale (DCI) et/ou molécule active (Dosage unitaire) *	Référence selon Codification Européenne ATC	Norm commercial du produit acheté A indiquer ici	Liste Présentation	Quantité par conditionnement	Nombre de boîtes	Date de péremption A indiquer ici
ALLERGOLOGIE							
CORTICOIDE	Betamethasone (2 mg)	H02AB 01		I Comprimés	20 comprimés	1	
TRAITEMENT états de choc	Epinéphrine** 1 mg/ml ou 0,3 mg/0,3 ml	C01CA 04		I SC ou IM	Kit injection	1	
ANTALGIQUES-ANTISPASMODIQUES							
ANTI-DOULEUR/ANTI- FIEVRE	Paracétamol (500 mg)	N02BE 01		Comprimés	16 comprimés	1	
ANTI-DOULEUR PUISSANT	Tramadol (100mg)	N02AX 02		II Comprimés	20 comprimés	1	
ANTISPASMODIQUE	Phloroglucinol (200 mg)	A03AX 12		Lyocs	10 Lyocs	1	
ANTI-INFLAMMATOIRES							
ANTI-INFLAMMATOIRE	Kétoprofène (50 mg)	M01AE 03		II Comprimés	24 comprimés	1	
CARDIOLOGIE							
CORONARODILATATE UR	Trinitrine 0,15 mg	C01DA 02		II Solution	Flacon spray	1	
DERMATOLOGIE							
ANTISEPTIQUE LOCAL	Chlorhexidine aqueuse (0,05%)	D08AC 02		Solution	Unidose	1 0	
CREME ECRAN TOTAL	Indice 60	D02BA		Crème	Tube 50 ml	1	
BRÛLURES traitement immédiat	Trolamine	D02AX		Emulsion	Tube 96 g	1	
CRÈME ANTIBACTERIENNE	Cuivre, Zinc, Sucralfate	D08AX		Crème	Tube 40 g	1	
GASTRO-ENTEROLOGIE							
ANTI-ACIDE GASTRIQUE	Aluminium/Magnésium hydroxydes	A02AD 01		Comprimés	40 comprimés	1	
ANTIDIARRHÉIQUE	Lopéramide (2 mg)	A07DA 03		II Gélules	20 Gélules	1	
HEMOSTASE							
ANTI AGREGANT plaquettaire	Acide acétyl salicylique (300 mg)	B01AC 06		I Poudre Sol. buv.	30 sachets	1	
INFECTOLOGIE							
ANTIBIOTIQUE PENICILLINE	Amoxicil. (500 mg) + Ac.Clav.(125 mg)	J01CR 02		I Comprimés	12 comprimés	1	
ANTIBIOTIQUE MACROLIDE	Josamycine (1g)	J01FA0 7		I Comprimés	10 comprimés	1	
OPHTALMOLOGIE							
COLLYRE antiseptique	Hexamidine 0.1%(0,6ml)	S01AX 08		Coll. Unidose	Unidose (10)	1	
COLLYRE anti- inflammatoire	Indometacine 0.1% 5mg	S01BC 01		Collyre unidose	Unidose 0.35ml (20)	1	
PSYCHIATRIE							
ANXIOLYTIQUE	Diazepam (5 mg)	N05BA 01		I Comprimés	40 comprimés	1	
ACCESSOIRES							
SPARADRAP				Rouleau	Rouleau	1	
COMPRESSES STÉRILES	20x20			Sachet unit.	Paquet (par 10)	3	
GANTS D'EXAMEN				Paires	Taille moyenne	5	

PANSEMENTS ADHESIFS	Stériles 4 côtés			Assortiment	Assortiment	1	
CONTENTION COHESIVE				Rouleau	4,5 m x 7 cm	1	
CONTENTION élastique	Adhésive			Rouleau	2,5m x 6cm	2	
EPINGLES de sureté				Tailles variées		1 2	
PINCE A ÉCHARDES						1	
THERMOMETRE MÉDICAL	Electronique					1	
SUTURES CUTANÉES	Adhésives			Stérile	Paquet	2	
CISEAUX						1	
GUIDE MEDICAL	Type guide Premiers Secours et Soins					1	

* L'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe.

** Epinéphrine 1mg/1ml : A conserver au frais (+ 2°C à + 8°C) et à l'abri de la lumière. A l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante. Une coloration brun-rose de la solution traduit sa dénaturation et la rend inutilisable. Ne pas utiliser au delà de la date de péremption. Toute trousse conservée à température ambiante doit être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Injection possible par multiples de 0,25 ml.

** Epinéphrine 0,3mg/0,3ml : A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C. Durée de vie du produit plus longue dans les conditions spécifiées. Délivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour l'enfant, une solution dosée à 0,15 ml / 0,3 ml est nécessaire).

La fiche informative accompagnant le produit dans sa boîte donne les informations de référence.

Les dates de péremption doivent être vérifiées régulièrement par le responsable du navire.

Les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription délivrée par un médecin à distance.

Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.

Les quantités proposées correspondent à un équipage de 6 personnes maximum.

Conseils complémentaires :

Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche permettant un accès facile aux différents produits qui doivent être rangés selon une organisation rationnelle. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et peu soumis aux variations thermiques.

Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments.

En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.

Un kit complémentaire est nécessaire pour les navigations en zone tropicale comprenant notamment des produits désinfectants de l'eau et des antipaludiques (se renseigner auprès des services de consultation de médecine tropicale et des voyages).